



**LES ACCES DOULOUREUX
PAROXYSTIQUES ET FENTANYL
D'ACTION RAPIDES GHAT**

FICHE D'IDENTITE

☞ **OBJET** :

- Permettre aux équipes soignantes d'identifier les accès douloureux paroxystiques de la douleur cancéreuse et connaître les modalités de traitements par Fentanyl® d'action rapide.

☞ **DOCUMENTS DE REFERENCE** :

- Article L.1110-5 du code de la santé publique (loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé).
- Plan de lutte contre la douleur en vigueur.
- HAS : Les médicaments des accès douloureux paroxystiques du cancer.
- HAS : Commission de transparence 18Mars 2009.

☞ **DOCUMENTS INTERNES ASSOCIES** : /

☞ **PROCESSUS DE RATTACHEMENT** :

- Prise en charge de la douleur.

☞ **ABREVIATIONS** :

- **ADP** : Accès Douloureux Paroxystiques.
- **FAR** : Fentanyl d'Action Rapide.
- **LI** : Libération Immédiate.
- **EMO** : Equivalent Morphine Orale.

☞ **ANNEXES** : /

REDIGE PAR	FONCTION	DATE
Karine LEGRAND	Président du CLUD	24/04/2021
VERIFIE PAR	FONCTION	DATE
Jean-Claude CLIQUENNOIS	Président de CME CHB	03/05/2021
Caroline LELEU	Chef de pôle inter-établissements en pharmacie	03/05/2021
APPROUVE PAR	FONCTION	DATE
Helene DERUDDRE	Directrice par intérim	03/05/2021

LISTE DE DIFFUSION

POUR APPLICATION

(DESTINATAIRES DU MESSAGE ELECTRONIQUE DE PUBLICATION POUR ACTIONS A METTRE EN PLACE)

- Les chefs de pôle.
- Les chefs de service.
- Les médecins.
- Le président du CLUD.
- Les cadres supérieurs de santé.
- Les cadres de santé.
- Le coordonnateur des soins CHT.



I. OBJECTIFS

Permettre aux équipes soignantes :

- D'identifier les accès douloureux paroxystiques de la douleur cancéreuse.
- Et connaître les modalités de traitements par Fentanyl d'action rapide, et les différentes molécules.

II. DOMAINES D'APPLICATION

AMM FAR uniquement dans la douleur cancéreuse.

III. DEFINITION D'UN ADP

Exacerbation transitoire d'une douleur cancéreuse existante déjà contrôlée par un traitement de fond adapté.

Survenue rapide inférieure à 3 minutes (< 10 min).

Intensité modérée à sévère.

Courte durée 30 minutes (15 à 60 minutes).

La douleur de fond est contrôlée, stabilisée.

EVA < 4/10.


4 ADP maximum/jour.

Sommeil préservé, activités habituelles possibles Peu ou pas d'effets secondaires.

Traitement des Accès douloureux efficaces > 50 % Traitement de fond > 60 mEq morphine/jour.

IV. PRINCIPE DE TRAITEMENT PAR FAR

Débuter à la posologie la plus faible, il n'y a pas d'équivalence entre la posologie du FAR et le traitement de fond en EMO





**LES ACCES DOULOUREUX
PAROXYSTIQUES ET FENTANYL
D'ACTION RAPIDES GHAT**

Les formes disponibles

Actiq, comprimé avec applicateur buccal 200, 400, 600, 800, 1200, 1600 (boite de 3).

Abstral, comprimé sublingual 100, 200, 300, 400, 600, 800 (boite de 10 ou 30 cps).

Breakyl, film orodispersible 200, 400 (boite de 10 ou 28 films).

Effentora, comprimé buccogingival (gingival ou sublingual) 100, 200, (boite de 4 ou 28 cps), 400, 600, 800 (boite de 28 cps).

Instanyl, pulvérisation nasale 50, 100, 200 (1 boite de flacons unidoses en modèle hospitalier ou 10 doses) Pecfent, pulvérisation nasale 100, 400ug (flacon compteur 2 ou 8 doses).

Recivit, comprimé sublingual 133, 267, 400, 533, 800 (boite de 15 ou 30 cps).

Molécule ce jour disponibles au livret de la pharmacie du CH Arras : Abstral, Instanyl.

Les conditions de prescription

Prescription 28 jours, délivrance 8 jours, ordonnance sécurisée (on peut préciser » à délivrer en une seule fois), réservé à l'adulte.

Pharmacologie

	Morphine LI	Oxycodone LI	Fentanyl LI			
			Actiq®	Abstral®	Effentora®	Instanyl®
Délai d'action moyen	30-40 min	15-30 min	15 min	15 min	10 à 15 min	10 min
Durée d'action (heure)	4	4	2	ND	ND	1
Biodisponibilité	30%	60-80%	50%	70% (estimée)	65%	89%
T_{max} (min)	60-90	60-90	20 à 40	22,5 à 240 (valeurs extrêmes)	46,8 min	12-15 min
1/2 vie (h)	2-3	4-5	7	7	ND	3-4
Délai avant prise d'une 2^{ème} dose pour le même ADP	240 min	240 min	30 min	15-30 min	30 min	10 min

Comment prendre un Fentanyl d'Action rapide FAR

- ADP prévisible ou déclenché par un mouvement involontaire (toux, défécation) :

Prendre un FAR dès le début de la douleur.

- ADP Non prévisible volontaire déclenché par un mouvement (la marche) ou induit par un soin ou provoqué par un acte thérapeutique ou diagnostic (Radiothérapie, imagerie) :

Prendre un FAR 10 à 15 min avant l'acte douloureux.



D100129-juin 2010 - Propriété Nycomed France. Reproduction totale ou partielle interdite. Ne peut être remis

Bénéfices attendus du traitement d'un ADP


- ◀ **Rapidité** d'action⁽¹⁾
- ◀ Durée d'action **adaptée à la durée de l'ADP**⁽²⁾




- ◀ Système d'administration **non invasif**⁽¹⁾

(1) Zeppetella G. et al. Pharmacotherapy of cancer-related episodic pain. *Expert Opin. Pharmacother* 2003;(4):493-502.
(2) Mary A. et al. Management of breakthrough pain due to Cancer. *Oncology* 1999;13(8):1103-8.

V. EXEMPLE DE SCHEMA THERAPEUTIQUE DE TITRATION AVEC RECIVIT





Mettre le comprimé directement sous la langue. Laisser le comprimé se désagréger.

Ne pas manger ni boire avant la dissolution.

Ne pas croquer ne pas sucer ne pas mâcher ne pas avaler le comprimé. Si sécheresse buccale, boire un peu d'eau avant la prise.

VI. EXEMPLE DE SCHEMA THERAPEUTIQUE DE TITRATION AVEC UNE MOLECULE DU LIVRET ABSTRAL

